Cereza n°1 (par erreur)

Vass3R04s566-570


duatedantialantialantial

0Mtp199

₩INA Collection Vassal-Montpellier

Contraction of the same

Cereza nº 1 3 R4 s 566-570



71 4

alautonliminalootuulioituul

N° d'ordre : Désignation : Cereza m° s

Emplacement: 3 & 4 \$ 566.540:

(\$568 + à arracher)

TAN BOURGEONNEMENT

Epanoui 182) - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cobonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entiègement bronzé ou cuivré 197 - vert 198,

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotomeuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure: blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuiurées 210 - entièrement bronzées ou ouivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à lisété carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées mera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Mervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - azanéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révaluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233.

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villocité gubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totaloment - sillon - partiellement.

77197

N' d'ordre :

Désignation :

Cereza nº 1 3 R 4. S. 566-570 Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250,

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253,

: dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256) Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.)

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge fonce 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert /265/ Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année : 1998

Code clone

Code cépage : Nom cépage: Cereza nos Observateur: Lacombe

Emplacement: 3 R4 A566_570

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne (5) - grande 7 - très grande 9.

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire (4) réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 trois 2 - cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyer (5) vert foncé 7.

oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle 1) point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe: nulle/1) point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) : absente 1 - présente 9)

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I et II) : absente 1) - présente 9.

oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

oiv 075 cloqure face supérieure limbe : nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1\)- faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1)- faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 -

moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087* densité poils dressés face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 1) - présente 9.

oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1)- présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1) faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court 3)- égal 5 plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 / faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1 / faible 3 - moyenne 5 - forte 7 -

Couleur du pétiole : vert (78)- partiellement coloré (77 - coloré 176.

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Annee 1998

Code cepage Nom cepage Cereza w1

Code clone

Observatem TL

Emplacement: 3 R4 \$566 - 570

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique (3) aplatie 5.

oiv 102 surface : unic D- côtelée 2 - strice 3

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2- rouge violacé 3 - gris 4

praire restout our

oiv 104 lenticelles, absentes(1)- présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence (1) - présence 9

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence présence 9

oiv 353 longueur entrenoeuds : tres courts (-60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9

oiv 351 diamètre entrenocuds : très petit (5mm) 1 petit (8mm) 3 moyen (11mm) (5)-grand

(14mm)(7)- tres grand (-17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : tres faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - tres élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 faible 3 « moyen 5 » elevé 7 « très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 : éleve / : très élevé 9

Vassal

Noeuds aplatis I movens 2- saillants i

vigueur: 4 entreweurs too developes